

CoMiss: ferramenta que auxilia no reconhecimento de sintomas suspeitos de APLV, contribuindo para um diagnóstico mais preciso.²⁹

SINTOMAS		ESCORE			
Choro*	0	≤ 1 hora/dia		ESCORE <input type="text"/>	
	1	1-1,5 horas/dia			
	2	1,5-2 horas/dia			
	3	2-3 horas/dia			
	4	3-4 horas/dia			
	5	4-5 horas/dia			
	6	≥ 5 horas/dia			
Regurgitação	0	0-2 episódios/dia		ESCORE <input type="text"/>	
	1	≥ 3 ou ≤ 5 episódios de volume pequeno			
	2	> 5 episódios de um volume > que 1 colher de café			
	3	> 5 episódios de um volume aproximadamente igual à metade do volume ingerido na refeição e em menos da metade do número de refeições no dia			
	4	Regurgitação contínua de pequenos volumes após 30 min. de cada refeição			
	5	Regurgitação de metade do volume total ingerido em, pelo menos, metade do número de refeições no dia			
	6	Regurgitação de todo o volume ingerido após cada refeição			
Fezes	4	Tipos 1 e 2 (fezes duras)		ESCORE <input type="text"/>	
	0	Tipos 3 e 4 (fezes normais)			
	2	Tipo 5 (fezes macias)			
	4	Tipo 6 (fezes líquidas, não relacionadas a infecções)			
	6	Tipo 7 (fezes aquosas)			
Pele	0 a 6	Eczema atópico	CABEÇA PESCOÇO TRONCO	BRAÇOS MÃOS PERNAS PÉ	ESCORE <input type="text"/>
		Ausente	0	0	
		Suave	1	1	
		Moderado	2	2	
	Severo	3	3		
	0 ou 6	Urticária	Não	Sim	<input type="text"/>
			0	6	
Respiratório	0	Sem sintomas respiratórios		ESCORE <input type="text"/>	
	1	Sintomas leves/ligeiros			
	2	Sintomas suaves			
	3	Sintomas severos			

* Choro por 1 semana ou mais, sem causa perceptível constatada pelos pais.

Escore Total

Fonte: Vandenplas et al, 2015

Apesar de não confirmar o diagnóstico, é uma ferramenta sugestiva de APLV, quando a pontuação somada é ≥ 12.²⁹

Checklist

Quantificação de sintomas para suspeita de APLV

Nº DE VEZES E VOLUME DE LEITE MATERNO OU FÓRMULA INFANTIL INGERIDOS (ml)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SINAIS E SINTOMAS *

DIGESTIVO

- Vômito
- Regurgitação frequente
- Refluxo
- Recusa alimentar
- Cólica
- Diarreia (com ou sem sangue)
- Constipação
- Dor abdominal

RESPIRATÓRIO

- Chiado
- Tosse crônica
- Asma
- Rinite alérgica

GERAIS

- Fadiga
- Letargia
- Dificuldade para dormir
- Inquietude

PELE

- Urticária
- Angioedema
- Eczema

TROCA DE FRALDAS

Número de trocas no dia: _____

Cor e consistência das fezes: _____

* Os sintomas devem ser avaliados sempre no contexto e nunca de maneira isolada.

** O checklist acima tem apenas a função de quantificar os sintomas apresentados pelo paciente e não serve como escore ou diagnóstico definitivo.