

CRITÉRIOS ROMA IV PARA DIAGNÓSTICO DOS DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS FUNCIONAIS¹ (FGIDs)

CONSTIPAÇÃO FUNCIONAL

Devem apresentar pelo menos 2 dos critérios abaixo por 1 mês, em lactentes e crianças até 4 anos:

- $2 \leq$ evacuações por semana
- Histórico de retenção excessiva de fezes e/ou evacuações dolorosas, difíceis e/ou fezes de grande diâmetro
- Presença de grande quantidade de fezes no reto
- Em caso de aleitamento materno exclusivo, menos de 1 evacuação por semana

CÓLICA FUNCIONAL

Inclui os sintomas a seguir em lactentes com menos de 5 meses:

- Períodos de choro recorrentes e prolongados, agitação ou irritabilidade sem causa aparente e que não podem ser prevenidos ou solucionados
- Ausência de falha de crescimento, febre ou enfermidade

REGURGITAÇÃO FUNCIONAL²

Inclui os sintomas a seguir em lactentes com 3 semanas a 12 meses:

- Regurgitação ≥ 2 vezes por dia durante ≥ 3 semanas
- Ausência de eructação e hematêmese, aspiração, apneia, falha de crescimento, dificuldade de alimentação ou deglutição ou ausência de arqueamento de tronco

DIARREIA FUNCIONAL

Inclui os sintomas a seguir em lactentes e crianças entre 6 meses a 5 anos:

- 4 ou mais evacuações diárias, sem dor, sem formato e em grande quantidade, por mais de 4 semanas
- Ausência de falha de crescimento com ingestão calórica adequada