

FLUXOGRAMA PARA O MANEJO

CÓLICA



FLUXOGRAMA PARA O MANEJO CONSTIPAÇÃO INTESTINAL



Diagnóstico de acordo com critério de ROMA IV:¹
(Devem apresentar pelo menos 2 dos critérios abaixo por 1 mês, em lactentes até 4 anos)

- 2 ou menos evacuações por semana
- Histórico de retenção excessiva de fezes e/ou aumento do diâmetro das fezes e/ou dor ao evacuar
- Presença de grande quantidade de fezes no reto
- Em caso de aleitamento materno exclusivo menos de 1 evacuação por semana

SINAIS DE ALERTA:

- Sem mecônio > 24h
- Distensão abdominal
- Vômitos
- Déficit de crescimento
- Fezes com sangue
- Atraso do desenvolvimento neurológico
- Anormalidades anais/sacrais
- Qualquer sinal de outras causas orgânicas

Manter aleitamento materno e, na sua impossibilidade, uso de fórmula infantil:

- Verificar a preparação da fórmula
- Considerar proteína parcialmente hidrolisada com prebióticos e ácido graxo Beta 2 palmítico

Se em alimentação complementar:

- Checar ingestão de líquidos e fibras

SIM → Verificar a necessidade de exames adicionais para diagnóstico

MELHORA SUFICIENTE?

SIM

NÃO

Manter conduta

Considerar uma dessas opções:

- Lactulose
- Polietilenoglicol em lactentes > 2 anos
- Trocar para fórmula extensamente hidrolisada ou de aminoácidos se suspeita de APLV
- Tratamento retal para alívio agudo (supositório de glicerina)

MELHORA SUFICIENTE?

SIM

Manter conduta

NÃO

Encaminhar ao Gastropediatra

Fonte: adaptado de: Vandenplas, Hauser, Salvatore, 2019² e Rosen, 2018^{2,5-6}
Material técnico-científico destinado exclusivamente a profissionais de saúde. Proibida distribuição e/ou reprodução total ou parcial. A distribuição deste material por meios digitais é uma exceção em razão das medidas de restrição tomadas frente à pandemia do COVID-19.

